

Eesti naiste rinnavähijuuring: rinnavähi hilisstaadiumis diagnoosimise riskitegurid

Meeskond

- Grandihoidja: Kaire Innos
- Põhitäitja: Mare Tekkel

Koostööpartnerid

- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
- SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Kestus: 2008–2011

Eesmärk

Hinnata rinnavähi hilisstaadiumis diagnoosimise riskitegureid Eestis tulenevalt nii patsiendist kui tervishoiukorraldusest.

Meetod

Uuringusse kutsuti naised, kellel diagnoositi Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogiakeskuses või Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogiakliinikus esmane rinnavähk. Neil paluti pärast kirjaliku informeeritud nõusoleku andmist osaleda küsitlusel ja anda vereproov. Kokku osales uuringus 1068 rinnavähi diagnoosiga patsienti. Vereproovi andis 887 patsienti.

Tulemused

- Esimese uuringuküsimusena käsitleti patsiendi viivitust ja selle riskitegureid rinnavähipatsientidel. Analüüsis leiti, et umbes kolmandik rinnavähiga patsientidest registreerus arsti vastuvõtule viivitusega. Viivituse tõenäosus oli suurem vanematel naistel, suitsetajatel ja naistel, kellel puudus varasem teave rinnavähi kohta. Viivitamise peamise põhjusena toodi esile sümptomite pidamist kahjututeks ja mitteolulisteks.
- Teine uuringuküsimus puudutas meditsiinisüsteemi viivitust ja selle riskitegureid, siin jätkub analüüs ja käsikirja ettevalmistamine, samuti on pooleli magistritöö.
- Kolmanda uuringuküsimusena käsitleti hilisstaadiumis diagnoosimise sotsiaalseid riskitegureid, jätkub andmete ettevalmistamine publitseerimiseks.
- Uuringutulemused on avaldatud ajakirjas Eur J Public Health, samuti Eesti Arstis ([„Viivitus esmasel arsti poole pöördumisel ja selle põhjused rinnavähipatsientidel Eestis“](#)). Ettevalmistamisel kolm käsikirja rahvusvahelistele ajakirjadele. Tehtud on ettekanne konverentsil [2011 European Public Health Conference](#).
- Projekti põhjal on kaitstud ka magistritöö „Patsiendi viivituse sotsiaalne taust rinnavähi diagnoosimisel Eestis“.

Rahastamine: [Eesti Teadusfondi grant nr 7384](#)