

Käär- ja pärasoolevähahaigete elulemus Eestis olenevalt kliinilistest teguritest (1997. a esmasjuhtude andmestiku alusel)

Meeskond

- Vastutav täitja: Kaire Innos
- Teised täitjad: Tiiu Aareleid, Margit Mägi, Pille Härmaorg, J. Soplepmann (Tartu Ülikooli Kliinikum), T. Suuroja (Põhja-Eesti Regionaalhaigla)

Kestus: 2010–2011

Eesmärk

- Uuringu eesmärk oli mõõta 1997. aastal diagnoositud käär- ja pärasoolevähi esmasjuhtude 10 aasta elulemust seoses sotsiaaldemograafiliste ja kliiniliste teguritega.
- Uuringu algandmestik koguti EURO CARE-3 uuringu raames, käesolevas uuringus täiendati andmestikku Eesti Vähiregistri andmetega haigestunute jälgimise kohta 2007. aasta lõpuni. Analüüsiti patsientide suhtelist elulemust (rahvastiku elutabelite alusel).

Tulemused

- Leiti, et Eestis oli tunduvalt paranenud käärsoolevähi, kuid mitte pärasoolevähi elulemus.
- Suur osa haigusjuhtudest diagnoositi endiselt hilises staadiumis ning määravaks võib pidada radikaalse kirurgilise ravi ning sobiva kiiritus- ja keemiaravi puudulikku rakendamist.
- Varases staadiumis diagnoositud, samuti radikaalselt opereeritud patsientide elulemus oli mõlema paikme puhul hea.
- Uuringu tulemused avaldatakse ajakirjas [Acta Oncol.](#)

Rahastamine: sihtfinantseeritav teadusteema [nr SF0940026s07](#)