

Valitud vähipaikmete ühe ja viie aasta suhteline elulemus koos 95% usaldusintervalliga (UI) leviku järgi, Eesti 2005–2009\*

Vähipaige	Suhteline elulemus															
	Lokaalne**		Lokaalselt/regionaalselt levinud**				Kaugmetastaasid**				Teadmata**					
	1-a.	95% UI	5-a.	95% UI	1-a.	95% UI	5-a.	95% UI	1-a.	95% UI	5-a.	95% UI				
Huul, suuõõs, neel	<b>81</b>	75–85	<b>59</b>	52–65	<b>57</b>	52–62	<b>25</b>	20–30	<b>27</b>	13–43	<b>0</b>	0–6	<b>18</b>	8–32	<b>11</b>	3–24
Magu	<b>80</b>	75–83	<b>62</b>	57–68	<b>61</b>	57–66	<b>26</b>	21–30	<b>14</b>	12–16	<b>2</b>	1–3	<b>16</b>	12–21	<b>5</b>	2–8
Käärsool	<b>90</b>	88–93	<b>83</b>	79–87	<b>77</b>	73–81	<b>52</b>	47–57	<b>33</b>	30–37	<b>7</b>	5–9	<b>25</b>	17–34	<b>11</b>	6–18
Pärasool jm.	<b>89</b>	86–92	<b>76</b>	71–81	<b>79</b>	74–83	<b>51</b>	45–57	<b>38</b>	33–43	<b>8</b>	5–12	<b>32</b>	22–42	<b>18</b>	9–29
Kõhunääre	<b>40</b>	30–50	<b>17</b>	9–28	<b>30</b>	25–36	<b>7</b>	4–12	<b>4</b>	3–5	<b>1</b>	0–1	<b>7</b>	5–11	<b>2</b>	1–5
Kops, hingetoru, bronh	<b>77</b>	73–80	<b>47</b>	42–52	<b>42</b>	39–45	<b>10</b>	8–13	<b>10</b>	8–11	<b>1</b>	0–1	<b>14</b>	11–18	<b>3</b>	1–5
Nahk, melanoom	<b>99</b>	97–101	<b>80</b>	75–84	<b>79</b>	70–87	<b>32</b>	21–45	<b>41</b>	28–53	<b>21</b>	11–34	<b>72</b>	50–86	<b>53</b>	30–75
Rind (naised)	<b>100</b>	99–101	<b>95</b>	93–97	<b>95</b>	93–96	<b>71</b>	68–74	<b>46</b>	40–53	<b>10</b>	7–15	<b>73</b>	65–80	<b>40</b>	28–53
Emakakeha	<b>94</b>	91–95	<b>86</b>	82–89	<b>65</b>	55–73	<b>40</b>	31–50	<b>42</b>	31–53	<b>17</b>	10–27	<b>66</b>	50–78	<b>38</b>	21–55
Emakakael	<b>98</b>	96–99	<b>87</b>	83–90	<b>78</b>	72–83	<b>47</b>	39–53	<b>39</b>	29–50	<b>19</b>	11–30	<b>62</b>	48–74	<b>50</b>	34–65
Munasari	<b>98</b>	94–100	<b>89</b>	81–94	<b>73</b>	68–77	<b>34</b>	28–39	<b>40</b>	33–47	<b>10</b>	6–15	<b>44</b>	30–56	<b>36</b>	23–50
Eesnääre	<b>98</b>	97–99	<b>92</b>	89–95	<b>94</b>	90–97	<b>70</b>	62–77	<b>65</b>	60–70	<b>22</b>	18–27	<b>76</b>	72–80	<b>57</b>	50–65
Neer, neeruvaagen	<b>94</b>	92–96	<b>86</b>	82–89	<b>70</b>	60–78	<b>44</b>	32–55	<b>23</b>	19–28	<b>8</b>	5–12	<b>54</b>	40–66	<b>34</b>	20–49
Kusepõis, kusejuha jm.	<b>89</b>	86–92	<b>74</b>	69–78	<b>44</b>	35–53	<b>17</b>	10–26	<b>16</b>	9–26	<b>5</b>	2–13	<b>52</b>	40–64	<b>34</b>	21–48

\* Arvutatud perioodmeetodil (esmasjuhud diagnoositud 2000–2008, elulemusanalüüsi periood 2005–2009)

\*\* Levik diagnoosimisel vähiteatise järgi: lokaalne; lokaalselt/regionaalselt levinud (levik naaberorganitesse ja/või regionaalsetesse lümfisõlmedesse); kaugmetastaasid; teadmata (andmed puuduvad; täpsustamata kaugelearenenud protsess)